


Cure de hernie inguinale

Qu'est-ce qu'une hernie inguinale ?

Une hernie inguinale est une grosseur qui se forme au niveau de l'aîne et qui correspond au passage d'un organe, le plus souvent l'intestin grêle, à travers un orifice naturel.



Quand opère-t-on une hernie inguinale ?

On propose une cure de hernie inguinale lorsque celle-ci est douloureuse ou devient trop volumineuse.

La principale complication des hernies est l'étranglement. Les signes qui doivent donner l'alerte sont l'apparition d'une douleur intense, d'apparition brutale ou assez rapide et l'impossibilité de rentrer la hernie. L'aggravation des symptômes peut conduire à l'apparition d'une occlusion intestinale, si l'intestin est coincé dans la hernie. Les signes sont l'arrêt des gaz et des matières, parfois associés à des vomissements. Une intervention chirurgicale est alors nécessaire en urgence.

Comment se déroule l'intervention ?

L'intervention consiste à réduire et réintégrer la hernie et à obturer l'orifice de la hernie avec une prothèse qui va servir de renfort et de protection de la paroi inguinale. Ces prothèses sont parfaitement tolérées par l'organisme et il n'existe pas de phénomène allergique.

Il y a plusieurs voies d'abord possibles pour réparer votre hernie (laparoscopie, incision inguinale) : celles-ci vous seront présentées et les avantages et inconvénients expliqués afin de prendre une décision dûment éclairée.

Quels sont les risques ?

Les complications lors d'intervention pour les hernies sont très rares.

Les complications principales sont :

- **L'infection de plaie ou de prothèse**
- **La rétention urinaire**
- **La douleur chronique**
- **La lésion testiculaire**

Les conséquences immédiates sont essentiellement représentées par les hématomes post-opératoires assez fréquents mais tout à fait bénins. Il s'agit de l'apparition, dans les jours qui suivent l'intervention, de bleus principalement situés au niveau de l'aîne et pouvant descendre dans les bourses chez l'homme. Aucun traitement n'est nécessaire en règle générale et tout rentre dans l'ordre en quelques jours.

Les activités physiques et sportives doivent être suspendues pendant 4 semaines. En effet, il est important d'éviter tout effort de soulèvement, pour éviter que la prothèse ne se déplace.

Le taux de récurrence des hernies opérées est actuellement faible.

Hospitalisation

La durée de l'hospitalisation est discutée avec le chirurgien.

L'intervention peut se dérouler en hôpital de jour ou en hospitalisation d'une nuit.

Après l'opération

Habituellement, quelques jours suffisent pour une récupération complète, et un retour à la vie normale.

Les activités physiques et le port de charges lourdes sont à éviter pendant le premier mois post-opératoire.

Des soins de plaie (désinfection et pansement) à faire par une infirmière à domicile sont prescrits pendant 10 jours.

Les douches sont autorisées. Pas de bains pendant 3 semaines.

En cas de signe d'infection (rougeur, gonflement, douleur, liquide malodorant), vous pouvez contacter les infirmières de consultation en chirurgie qui vous donneront un rendez-vous avec votre chirurgien.

Si après l'intervention chirurgicale vous présentez les symptômes suivants, nous vous conseillons de vous rendre aux urgences :

- ❖ **Douleur abdominale postopératoire qui ne régresse pas ou qui augmente**
- ❖ **Fièvre persistante**
- ❖ **Incapacité à s'alimenter suite à des nausées et vomissements**